

大鵬薬品 添付文書集

指定医薬部外品



大鵬薬品工業株式会社

目次

CONTENTS

| | | |
|-----------------|-------|---|
| ● ソルマック胃腸液プラス | | 1 |
| ● ソルマック 5 | | 3 |
| ● チオビタ・ドリンク | | 5 |
| ● チオビタドリンク 2000 | | 7 |



食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけに、7種類の生薬配合

ソルマック胃腸液プラス

1本50mL入 梱[8本1箱×6]



50mL×1本
350円



50mL×8本
2,800円



50mL×8本×6
16,800円



ITF
コード



149 87117 39808 0



| 製品名 | 包装 | サイズ*(mm) | 重量(g) | 使用期限 |
|-----------------|--------------|-------------|-------|------|
| ソルマック胃腸液 プラス | 1本(50mL) | 胴径44×105 | 135 | 3年 |
| | 1箱(50mL×8本) | 89×177×107 | 1,145 | |
| | 梱(50mL×8本×6) | 280×365×115 | 7,100 | |

※瓶・箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

健胃清涼剤
生薬配合

ソルマック[®]胃腸液プラス

服用に際してはラベルをよく読むこと。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を食前または食間に服用して下さい。

- 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

成分 1本(50mL)中

| | |
|-----------|-------------------|
| ウコン流エキス | 0.3mL(鬱金300mgに相当) |
| カンゾウ抽出物 | 10mg(甘草143mgに相当) |
| エンメイソウエキス | 30mg(延命草201mgに相当) |
| ニンジンエキス | 200mg(人参606mgに相当) |
| アカメガシワエキス | 50mg(赤芽櫛500mgに相当) |
| ケイヒ油 | 1.5mg |
| チョウジ油 | 5mg |
| カルニチン塩化物 | 120mg |

添加物：プロピレングリコール、果糖、ブドウ糖、アルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、*l*-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、香料
(アルコール0.5mL以下)

- 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包装

50mL瓶入り

● 上記の内容はラベルに表示しております。



製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

®：登録商標

食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけに、5種類の生薬配合

ソルマック5

1本50mL入 梱[8本1箱×6]



50mL×1本
350円



1箱(50mL×8本)
2,800円



梱(50mL×8本×6)
16,800円



ITF
コード



| 製品名 | 包装 | サイズ*(mm) | 重量(g) | 使用期限 |
|--------|--------------|-------------|-------|------|
| ソルマック5 | 1本(50mL) | 胴径44×105 | 135 | 3年 |
| | 1箱(50mL×8本) | 89×177×107 | 1,145 | |
| | 梱(50mL×8本×6) | 280×365×115 | 7,100 | |

*瓶・箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ(単位：mm)

健胃清涼剤
生薬配合

ソルマック5

販売名：ソルマック5

服用に際してはラベルをよく読むこと。

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を食前に服用して下さい。

- 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

成分 1本(50mL)中

| | |
|---------------|----------------------|
| ウコンエキス | 200mg(鬱金2000mgに相当) |
| コウジンエキス | 83.3mg(紅参333.2mgに相当) |
| ソヨウエキス | 37mg(蘇葉333mgに相当) |
| チョウジ油(丁子油) | 5mg |
| グリチルリチン酸二カリウム | 7.2mg |

添加物：グリセリン、果糖、プロピレングリコール、ブドウ糖、ポビドン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、*l*-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、香料

- 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包装

50mL瓶入り

● 上記の内容はラベルに表示しております。



製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

® : 登録商標

疲労の回復・予防に、タウリン・ビタミンB1/B2/B6・カルニチン塩化物配合

チオビタ・ドリンク

1本100mL入 箱[10本1箱×5]、梱[2本1パック×15]、梱[3本1パック×10]



100mL×1本
146円 4 987117 438710

100mL×10本
1,460円 4 987117 438741

100mL×10本×5
7,300円 4 987117 438802

ITF
コード 149 87117 43880 9



シュリンクパック
100mL×2本
292円 4 987117 438956

シュリンクパック
梱(100mL×2本×15)
4,380円 4 987117 438963

ITF
コード 149 87117 43895 3



シュリンクパック
100mL×3本
438円 4 987117 438918

100mL×3本×10
4,380円 4 987117 438932

ITF
コード 149 87117 43893 9

.....

| 製品名 | 包装 | サイズ [※] (mm) | 重量(g) | 使用 期限 |
|-----------|----------------|-----------------------|--------|----------|
| チオビタ・ドリンク | 1本(100mL) | 胴径45.1×119 | 208 | 3年 |
| | 1箱(100mL×10本) | 96×231×122 | 2,176 | |
| | 梱(100mL×10本×5) | 240×492×128 | 11,196 | |
| | 2本(100mL×2本) | 45×90×120 | 416 | |
| | 梱(100mL×2本×15) | 280×255×130 | 6,512 | |
| | 3本(100mL×3本) | 45×135×120 | 624 | |
| | 梱(100mL×3本×10) | 280×255×130 | 6,512 | |

※瓶・箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ(単位：mm)

エクストラ
100mL×1本
146円 4 987117 438871

エクストラ
100mL×10本
1,460円 4 987117 438888

エクストラ
100mL×10本×5
7,300円 4 987117 438895

ITF
コード 149 87117 43889 2

ビタミン含有保健剤

チオビタ®・ドリンク

服用に際してはラベルをよく読むこと。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. しばらく服用しても症状がよくなるしない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

- 疲労の回復・予防
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
 - ◇疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい
- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。

- 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

成分 1本100mL中

タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mg、チアミン硝酸物(ビタミンB₁) 5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 5mg、カルニチン塩化物 100mg、無水カフェイン 50mg

添加物：果糖ブドウ糖液糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、クエン酸、クエン酸Na、D-ソルビトール、バニリン、エチルバニリン、香料

- 本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包装

100mL瓶入り

●上記の内容はラベルに表示しております。

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

®：登録商標

滋養強壮・栄養補給に、タウリン(2000mg)・ビタミンB1/B2/B6・カルニチン塩化物配合

チオビタドリンク2000

1本100mL入 梱[10本1箱×5]、梱[3本1パック×10]



100mL×1本
180円



100mL×10本
1,800円



100mL×10本×5
9,000円



ITF
コード



シュリンクパック
100mL×3本
540円



100mL×3本×10
5,400円



ITF
コード



| 製品名 | 包装 | サイズ*(mm) | 重量(g) | 使用期限 |
|------------------|----------------|-------------|--------|------|
| チオビタドリンク 2000 | 1本(100mL) | 胴径45.1×119 | 208 | 3年 |
| | 1箱(100mL×10本) | 96×231×122 | 2,176 | |
| | 梱(100mL×10本×5) | 240×492×128 | 11,196 | |
| | 3本(100mL×3本) | 45×135×120 | 624 | |
| | 梱(100mL×3本×10) | 280×255×130 | 6,512 | |

*瓶・箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

ビタミン含有保健剤

チオビタ®ドリンク 2000

服用に際してはラベルをよく読むこと。

使用上の注意

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、発疹があらわれた場合
 - (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合
2. 下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

効能・効果

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。

- 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

成分

1本100mL中
タウリン 2000mg・イノシトール 50mg・ニコチン酸アミド 20mg・チアミン硝酸物(ビタミンB₁) 5mg・
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂) 5mg・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 5mg・
カルニチン塩化物 100mg・無水カフェイン 50mg
添加物：白糖・果糖・ブドウ糖・DL-リンゴ酸・没食子酸プロピル・安息香酸Na・pH調整剤・バニリン・
香料

- 本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包装

100mL瓶入り

● 上記の内容はラベルに表示しております。



製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

®：登録商標



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町 1-27